

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

自願公告

SYS6002單藥用於治療晚期宮頸癌的I期臨床研究數據

於2026年國際婦科腫瘤學會全球年會(IGCS 2026)上以快速口頭報告形式公佈

石藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本集團已於2026年國際婦科腫瘤學會全球年會(IGCS 2026)上，以快速口頭報告形式公佈SYS6002單藥用於治療晚期宮頸癌的I期臨床研究(「該研究」)數據。

研究概況

該研究是一項全國多中心I期臨床試驗，旨在評價SYS6002在晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性、藥代動力學特徵及初步療效。本次會議上，本集團公佈了SYS6002單藥治療既往經治晚期宮頸癌的試驗結果。

截至2026年5月8日，該研究共入組患者82例，並被分配至兩個劑量組，其中2.4 mg/kg每2周給藥一次劑量組39例、3.6 mg/kg每3周給藥一次劑量組43例，中位隨訪時間為16.1個月。相關安全性和療效數據如下：

- 安全性方面，上述兩個劑量組的安全性總體可控，治療相關不良事件多為1-2級。其中，眼部相關不良事件最為常見，但未出現3級及以上事件，也無一例因此停藥。間質性肺病和非感染性肺炎發生率較低(2.4%)，治療相關皮疹發生率和級別均較低(任何級別：20.7%；3級及以上：1.2%)，且未發生史蒂文斯-約翰遜綜合症或中毒性表皮壞死

鬆解症。周圍神經病變發生率和級別亦較低(12.2%；均為1–2級)。此外，未發生導致死亡的治療相關不良事件。

- 有效性方面，兩種給藥方案均在研究人群中顯示出初步的療效。2.4 mg/kg每2周給藥一次劑量組的確認客觀緩解率為35.9%，3.6 mg/kg每3周給藥一次劑量組的確認客觀緩解率為28.6%。兩組達到確認緩解患者的中位緩解持續時間分別為8.2個月和10.3個月；中位無進展生存期分別為4.1個月和4.3個月；中位總生存期分別為15.1個月和11.5個月。

目前，SYS6002 2.4 mg/kg每2周給藥一次方案用於免疫治療經治晚期宮頸癌的研究已進入III期臨床試驗(NCT07230626)。

關於SYS6002

SYS6002是一種靶向Nectin-4的新一代抗體偶聯藥物(ADC)。該藥物通過採用酶催化定點抗體偶聯技術，將有效的有絲分裂抑制劑MMAE針對性地導向表達Nectin-4的癌細胞。此外，SYS6002穩定的連接子設計不僅有助於將高濃度的MMAE送達腫瘤中，還能通過減少毒素的全身暴露而降低毒性。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，2026年10月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、蔡磊博士、魏青杰先生、張翠龍先生、王振國先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生、陳衛平先生、屈志勇先生及張翊維先生；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。